



ROTER

COMPRIMÉS ROTER

TRAITEMENTS DES AFFECTIONS GASTRO-DUODENALES ET DES TROUBLES GASTRO-INTESTINAUX

Formule : Sous-Nitrate de Bismuth 350 mg — Carbonate de Magnésie 400 mg — Bicarbonate de soude 200 mg — Bourdaine pulv. 25 mg — Calamus pulv. 25 mg — Stearate de magnésie, talc, amidon : Q.S. pour un comprimé.

Les comprimés ROTER sont l'aboutissement de recherches scientifiques sur l'action thérapeutique du Bismuth et d'une expérimentation clinique étendue dans le domaine des affections gastro-duodénales.

L'association médicamenteuse réalisée par les "Comprimés ROTER" offre une synergie efficace du traitement des troubles gastro-duodénaux.

Par leur capacité d'absorption, les "Comprimés ROTER" diminuent l'hyper-sécrétion pathologique des voies digestives. Par leurs composants ils permettent de :

- calmer la douleur ;
- diminuer l'hypersthénie, cause des vomissements ;
- protéger les muqueuses ;
- rétablir un transit normal ;
- éviter la constipation ;
- reprendre du poids ;
- retourner à un équilibre nerveux normal.

Par sa fabrication spéciale, le "BISMUTH ROTER", outre ses propriétés astringentes et antibactériennes, assure, par un processus physico-colloïdal, à ses particules extrêmement fines, un pouvoir bio-électrique particulier. Le bicarbonate de soude a un effet neutralisant destiné à réduire l'hyperacidité. Il est dosé de telle sorte que l'alcalinisation du contenu de l'estomac n'entrave pas l'action pepsique et ne détruit pas le pouvoir bactéricide du suc gastrique. L'acide carbonique libéré exerce un léger effet anesthésique local, diminue les nausées et les douleurs et réduit le péristaltisme.

Le carbonate de magnésie complète et régularise l'action du bicarbonate de soude. Il corrige, en outre, les tendances à la constipation.

La bourdaine, outre son action protectrice sur la muqueuse stomacale, apporte ses effets laxatifs.

Le calamus, stomachique amer, excite l'appétit et favorise le mécanisme digestif.

INDICATIONS :

Les comprimés "ROTER" sont utilement conseillés :

- Gastrite Duodénite ;
- Hyperacidité réflexe ;
- Troubles neuro-végétatifs (aérophagie) ;
- Pyrosis et vomissements de la femme enceinte.

POSOLOGIE :

Se conformer au régime hygiéno-diététique et aux prescriptions du médecin. Sauf indications particulières, le traitement est ainsi conduit :

Pendant 2 ou 3 mois : prendre immédiatement après chacun des 3 repas, 2 comprimés dans un peu d'eau tiède.

Pendant les 2 ou 3 mois suivants réduire la dose à 1 comprimé après chacun des 3 repas.

Pendant la cure des comprimés ROTER, le teint vert foncé des matières est tout à fait normal.

Le médecin jugera si le traitement doit être repris après une période de repos.

Les comprimés ROTER sont présentés sous deux formes :

- Boîtes contenant 40 comprimés ;
- Boîtes contenant 120 comprimés.

PHARMACEUTISCHE FABRIEK "ROTER" - HILVERSUM - HOLLAND

France et Communauté :

LABORATOIRES SEPROTHER

5, boulevard des Acacias — Toulon (Var) — Tél. : 92.52.94

Visa N° 26263 B 9052 - 26263 - B - P 35887

IMP. BARTOLOMEI - TOULON